

VISOKA ZDRAVSTVENO-SANTARNA ŠKOLA  
STRUKOVNIH STUDIJA

# "VISAN"

*Pro Futuro !*

**ZA**

**BUDUĆNOST !**



**KVALIFIKACIONI ISPIT**

**PITANJA I ZADACI IZ HEMIJE**

## KVALIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE- PITANJA

1. Koji od navedenih gasova **reaguje** sa vodenim rastvorom kalijum-hidroksida?  
1) NH<sub>3</sub> 2) NO 3) SO<sub>2</sub> 4) N<sub>2</sub>O 5) CO

2. Koliko ima strukturnih izomera sa molekulsom formulom C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O?  
1) 6 2) 5 3) 4 4) 3 5) 2

3. Koje je sistematsko ime jedinjenja molekulske formule C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>, u kome su svi ugljenikovi atomi sp<sup>2</sup> hibridizovani?  
1) 1,2-butadien 2) 1,3-butadien 3) 2-butan 4) 1-metilciklopropen 5) ciklobuten

4. Koliko je mola fenola potrebno da bi u reakciji sa natrijumom nastalo 224 cm<sup>3</sup> vodonika  
(normalni uslovi)  
1) 0,02 2) 0,01 3) 0,2 4) 0,1 5) 0,025

5. Jedinjenje koje **ne redukuje** Fehling-ov rastvor, a izomerno je sa 3-metilbutanalom je:

- 1) 2,3-dimetilbutanal 2) 3-metil-2-pentanol  
3) 3-metil-2-butanol 4) butanon 5) 3-pantanon

6. Koliko ima jona vodonika u 100 mL rastvora koji je pH = 2?  
1) 6 10<sup>20</sup> 2) 2 3) 6 10<sup>2</sup> 4) 10<sup>-2</sup> 5) 200

7. Koliko e mola propanoil-hlorida nastati reakcijom 0,1 mola fosfor-trihlorida sa odgovaraju im jedinjenjem?  
1) 0,5 2) 0,3 3) 0,2 4) 0,4 5) 0,6

8. Fozgen je:

- 1) diamid ugljene kiseline 2) amid ftalne kiseline 3) tercijarni amin  
4) hlorid mravlje kiseline 5) dihlorid ugljene kiseline

9. Koje od navedenih tvr enja **nije ta no?**

- 1) tioli u reakciji sa bazama grade merkaptide  
2) alkoholi su ja e kiseline od tiola  
3) soli tiola lako hidrolizuju  
4) dejstvom blagih oksidacionih sredstava tioli se oksiduju u disulfide  
5) dejstvom jakih oksidacionih sredstava tioli se oksiduju u sulfonske kiseline

10. Koje od navedenih jedinjenja sa kiselinama gradi soli?

- 1) nitrometan 2) acetonitril 3) trietil-amin 4) dioksan 5) furan

11. Koja od navedenih aminokiselina može da gradi diestar?

- 1) asparaginska kiselina 2) izoleucin 3) triptofan 4) glicin 5) histidin

12. U molekulu jednog od navedenih dipeptida za ugljenikov atom koji je susedan slobodnoj

karboksilnoj grupi vezana je izobutil-grupa. Koji je to dipeptid?

- 1) valilleucin 2) leucilvalin 3) valilizoleucin 4) izoleucilvalin 5) alanilvalin

13. Kataliti kom redukcijom pirola dobija se:

- 1) anilin 2) piran 3) pirolidin 4) piperdin 5) pirimidin

14. Sa Fehling-ovim (Felingovim) reagensom može da reaguje:

- 1) glukoza-1,6-difosfat 2) glukonska kiselina 3) glukuronska kiselina  
4) -metil-D-glukozid 5) glukoza-1-fosfat

15. Koje od navedenih tvr enja **nije ta no?**

- 1) Skrob je heteropolisaharid 2) Glikogen je polisaharid životinjskog porekla  
3) Celuloza je homopolisaharid 4) Dekstrini nastaju delimi nom hidrolizom skroba  
5) Amiloza ima spiralnu strukturu

16. Koje od navedenih kiselina ulaze u sastav triglicerida, ako se za potpuno kataliti ko hidrogenovanje 0,25 mol tog glicerida troši  $4,5 \times 10^{23}$  molekula vodonika?

- 1) palmitinska, arahidonska, palmitoleinska 2) linolenska, oleinska, palmitinska  
3) linolna, oleinska, palmitoleinska 4) palmitinska, stearinska, arahidonska  
5) linolna, stearinska, palmitoleinska

17. Izra unati broj elektrona jona  $\text{Ca}^{2+}$ , ako je Z (Ca) = 20.

- 1) 27 2) 18 3) 20 4) 30 5) 40

18. Koje od navedenih jedinjenja ima **samo** jonski tip veze?

- 1)  $\text{CH}_4$  2)  $\text{NaNO}_3$  3)  $\text{NH}_4\text{Cl}$  4)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  5) KI

19. Pri reakciji nastajanja te ne vode iz elemenata osloba a se 71,45 kJ toplote svedeno na standardne uslove. Koliko je  $\text{dm}^3$  kiseonika (n.u.) u estvovalo u reakciji ako se zna da je

vrednost standardne entalpije stvaranja te ne vode  $fH = -285,8 \text{ kJ/mol}$  ?

- 1) 11,2 2) 2,8 3) 4 4) 5,6 5) 8

20.

-

?

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

21. Koliko je  $\text{cm}^3$  koncentrovane azotne kiseline ( $w=0,63$ ;  $=1,4 \text{ g/cm}^3$ ) potrebno za pravljenje  $250 \text{ cm}^3$  rastvora koncentracije  $0,15 \text{ mol/dm}^3$ ?

- 1) 2,68 2) 5,36 3) 8,04 4) 4,02 5) 1,34

22. Kolika je koncentracija magnezijumovih jona ( $\text{mmol/dm}^3$ ) u rastvoru magnezijum-hlorida koncentracije  $0,005 \text{ mol/dm}^3$ , ako je stepen disocijacije 92%?

- 1) 0,046 2) 4,6 3) 0,0092 4) 9,2 5) 0,46

23. Na osnovu datih vrednosti za  $K_a$ , odrediti koja kiselina je **najja a** u vodenom rastvoru?

$$K_a(HCN)=7,9 \times 10^{-9} \quad K_a(HClO)=5 \times 10^{-5} \quad K_a(CH_3COOH)=1,8 \times 10^{-5}$$

$$K_a(HNO_2)=4 \times 10^{-4} \quad K_a(HF)=6,6 \times 10^{-4}$$

- 1) HCN 2) HClO 3) CH<sub>3</sub>COOH 4) HNO<sub>2</sub> 5) HF

24. Koliko je potrebno miligrama natrijum-hidroksida za neutralizaciju 20 cm<sup>3</sup> rastvora azotne kiseline u kome je pH = 3? (Ar(Na) = 23)

- 1) 2 2) 8 3) 20 4) 40 5) 0,8

25. Koji od navedenih vodenih rastvora soli reaguje **bazno**?

- 1) CH<sub>3</sub>COONH<sub>4</sub> 2) AlCl<sub>3</sub> 3) NH<sub>4</sub>Cl 4) KCl 5) NaHCO<sub>3</sub>

26. Bikarbonatni pufer se priprema tako što se u vodenim rastvorima NaHCO<sub>3</sub> uvodi CO<sub>2</sub>. Koja

komponenta puferske smeše reaguje sa H<sup>+</sup> ionima pri dodatku kiseline?

- 1) CO<sub>2</sub> 2) H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 3) NaHCO<sub>3</sub> 4) Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 5) H<sub>2</sub>O

27. Koje se od navedenih tvrđenja odnosi na prave rastvore?

- 1) pokazuju Faradej-Tindalov efekat  
2) estice disperzne faze ne prolaze kroz membrane sa finim porama  
3) estice disperzne faze se talože pri stajanju rastvora  
4) estice disperzne faze se talože dodatkom disperznog sredstva  
5) veličina estica disperzne faze je manja od 1nm

28. U reakciji bakra sa razblaženom azotnom kiselinom nastaje bakar(II)-nitrat, azot(II)-oksid i voda. Koliko će se cm<sup>3</sup> azot(II)-oksidu (normalni uslovi) osloboditi u reakciji 76,8 mg bakra sa razblaženom azotnom kiselinom? Ar(Cu) = 64

- 1) 8,96 2) 22,4 3) 17,92 4) 35,84 5) 896

29. Pri elektrolizi zasićenog vodenog rastvora KCl na anodi se izdvaja:

- 1) HCl 2) H<sub>2</sub> 3) O<sub>2</sub> 4) Cl<sub>2</sub> 5) Cl<sub>2</sub>O

30. Koliko miligrama odgovarajućeg oksida je potrebno da se u reakciji sa vodom dobije 1 mmol azotne kiseline? (Ar(N)=14)

31. Koliko ima valentnih elektrona elementa koji imaju elektronsku konfiguraciju 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>5</sup>?

- 1) 5 2) 3 3) 7 4) 2 5) 1

32. U molekulu amonijum-hlorida postoji:

- 1) samo polarna kovalentna veza,  
2) samo nepolarna kovalentna veza,  
3) samo jonska veza,  
4) jonska i polarna kovalentna veza,  
5) jonska, polarna kovalentna i koordinativno-kovalentna veza.

33. Pri sagorevanju 1 g metalnog kalcijuma u istom kiseoniku osloba a se 15,9 kJ toplote svedeno na standardne uslove. Vrednost standardne entalpije stvaranja ( $\Delta_f H$ ) kalcijum-oksida izražena u kJ/mol iznosi:  $Ar(Ca) = 40$

- 1) 1272 2) - 636 3) 318 4) - 318 5) – 1272

34. Koliko je grama natrijum-hidroksida potrebno za pripremanje 0,025 dm<sup>3</sup> rastvora u kom je  $w = 0,20$  i  $\rho = 1,2$  g/cm<sup>3</sup>?

- 1) 6 2) 0,6 3) 24 4) 3 5) 30

35. Kolika je pOH rastvora sumporne kiseline ija je koncentracija  $c=0,005$  mol/dm<sup>3</sup>? Sumporna kiselina je potpuno disosovana?

- 1) 12 2) 4 3) 2,3 4) 6 5) 2

36. U kom od navedenih nizova sa nalaze samo one soli iji vodenim rastvorima reaguju **kiselo**?

- 1) ZnBr<sub>2</sub>, NaHSO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KHS
- 2) NaHCO<sub>3</sub>, AlCl<sub>3</sub>, FeCl<sub>3</sub>, NaHS
- 3) NaHS, NaHCO<sub>3</sub>, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, KBr
- 4) FeCl<sub>3</sub>, KHSO<sub>4</sub>, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>Cl
- 5) NaHSO<sub>4</sub>, FeCl<sub>3</sub>, KHS, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

37. Koja od navedenih ekvimolarnih smeša rastvora ima puferske osobine?

- 1) HCl i NH<sub>4</sub>Cl
- 2) CH<sub>3</sub>COONa i HCl
- 3) CH<sub>3</sub>COOH i KCl
- 4) CH<sub>3</sub>COOH i CH<sub>3</sub>COONa
- 5) HNO<sub>3</sub> i CH<sub>3</sub>COONa

38. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?

- 1) Kod emulzija je disperzna faza vrstog agregatnog stanja.
- 2) Suspenzije i emulzije su stabilni disperzni sistemi.
- 3) Suspenzije su stabilniji disperzni sistemi od koloidnih sistema.
- 4) Kod emulzija su disperzno sredstvo i disperzna faza istog agregatnog stanja.

39. Pri elektrolizi rastopljenog kalijum-hidroksida na katodi se izdvaja:

- 1) K<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 2) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 3) H<sub>2</sub> 4) K 5) KO<sub>2</sub>

40. Koji od navedenih elemenata **ulazi** u sastav hemoglobina?

- 1) Co 2) Mg 3) Cu 4) Fe 5) Mn

41. Po kojoj hemijskoj reakciji se razlikuju butanal i 2-pentanon?

- 1) Oksidacijom daju smešu kiselina
- 2) Reaguju sa hidroksil-aminom
- 3) Grade acetale
- 4) Reaguju sa Grignard-ovim reagensom
- 5) Reaguju sa vodonikom

42. Koje od navedenih tvrđenja je tačno:

- 1) Karboksilne kiseline su slabije kiseline od ugljene kiseline
- 2) Fenoli su jače kiseline od ugljene kiseline
- 3) Karbonatna kiselina je slabija kiselina od karboksilnih kiselina
- 4) Limunska kiselina je optički aktivna
- 5) Benzoeva kiselina nastaje hidrolizom toluena

43. Koliko grama sirupetne kiseline nastaje u reakciji acet-anhidrida sa  $5 \times 10^{-3}$  mol vode?

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 0,6
- 4) 0,3
- 5) 0,06

44. Koje od navedenih jedinjenja u reakciji sa dovoljnom količinom amonijaka daje ureu?

- 1)  $\text{H}_2\text{CO}_3$
- 2)  $\text{CH}_3\text{COCl}$
- 3)  $\text{COCl}_2$
- 4)  $(\text{C}_2\text{H}_5\text{CO})_2\text{O}$
- 5)  $\text{HCOOC}_2\text{H}_5$

45. Kada se reakcija dešava između atoma ija je elektronska konfiguracija u osnovnom stanju  $1s^2 2s^2 2p^5$  i  $1s^2 2s^2 2p^5$  formira se:

- 1) polarna kovalentna veza
- 2) nepolarna kovalentna veza
- 3) jonska veza
- 4) metalna veza
- 5) vodonikova veza

46. Koncentracija  $\text{OH}^-$  jona u rastvoru amonija nog pufera jednaka je vrednosti konstante discocijacije baze, kada su koncentracije:

- 1) amonijaka 1 mol/dm<sup>3</sup>; amonijum-hlorida 0,5 mol/dm<sup>3</sup>
- 2) amonijaka 0,5 mol/dm<sup>3</sup>; amonijum-hlorida 1 mol/dm<sup>3</sup>
- 3) amonijaka 1 mol/dm<sup>3</sup>; amonijum-hlorida 1 mol/dm<sup>3</sup>
- 4) amonijaka 0,1 mol/dm<sup>3</sup>; amonijum-hlorida 0,5 mol/dm<sup>3</sup>
- 5) amonijaka 1 mol/dm<sup>3</sup>; amonijum-hlorida 0,2 mol/dm<sup>3</sup>

47. Elektroda na kojoj će se pri elektrolizi zasićenog vodenog rastvora natrijum-hlorida izdvojiti  $\text{H}_2$  (g) je:

- 1) katoda, pozitivan pol
- 2) anoda, negativan pol
- 3) standardna vodonikova elektroda
- 4) anoda, pozitivan pol
- 5) katoda, negativan pol

48. Histamin je derivat:

- 1) imidazola
- 2) pirimidina
- 3) tiofena
- 4) furana
- 5) pirolidina

49. Laktoza se sastoji od:

- 1) -D-galaktopiranoze i D-glukopiranoze
- 2) -D-glukopiranoze i -D-galaktopiranoze
- 3) -D-glukopiranoze i D-glukopiranoze
- 4) -D-manopiranoze i D-glukopiranoze
- 5) -D-glukopiranoze i -D-manopiranoze

50. Ukupan broj atomskih orbitala na trejem energetskom nivou je:

- 1) 9
- 2) 18
- 3) 4)
- 4) 10
- 5) 5

51. U kom od navedenih nizova se nalaze **samo** ona jedinjenja koja imaju samo jonski tip veze:

- 1) K<sub>2</sub>O, CaF<sub>2</sub>, HCl, Na<sub>2</sub>S
- 2) K<sub>2</sub>O, CaF<sub>2</sub>, KCl, H<sub>2</sub>S
- 3) K<sub>2</sub>O, CaF<sub>2</sub>, KCl, Na<sub>2</sub>S
- 4) K<sub>2</sub>O, CaF<sub>4</sub>, KCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- 5) K<sub>2</sub>O, CaF<sub>2</sub>, KCl, NH<sub>3</sub>

52. Koji od navedenih rastvora sirjetne kiseline ima **najveći** stepen disocijacije ( ) na datoj temperaturi?

- 1) 1 mol/dm<sup>3</sup>
- 2) 0,1 mol/dm<sup>3</sup>
- 3) 0,5 mol/dm<sup>3</sup>
- 4) 0,05 mol/dm<sup>3</sup>
- 5) 0,01 mol/dm<sup>3</sup>

53. Koje od navedenih tvrđenja **nije tačno**?

- 1) Veličina estica disperzne faze kod pravih rastvora je manja od 1 nm.
- 2) Suspenzije i emulzije su nestabilni disperzni sistemi.
- 3) Koloidne estice se mogu istaložiti dodatkom elektrolita (soli).
- 4) Disperzna faza kod emulzija je vrstog agregatnog stanja.
- 5) Proces taloženja koloidnih estica naziva se koagulacija

54. U navedenom nizu monohidroksitrikarboksilna kiselina je:

- 1) oksalna kiselina
- 2) limunska kiselina
- 3) ilibarna kiselina
- 4) jabučna kiselina
- 5) vinska kiselina

55. U koju grupu Periodnog sistema elemenata spada element koji je konfiguracija poslednjeg nivoa elektronskog omota  $a^2 2r^3$ ?

- 1) I
- 2) II
- 3) III
- 4) IV
- 5) V

56. Koji od navedenih elemenata može da gradi neorgansku kompleksnu so?

- 1) Zn
- 2) Ba
- 3) Na
- 4) Li
- 5) C

57. U nizu navedenih jedinjenja slab elektrolit je:

- 1) NH<sub>4</sub>Cl
- 2) HJ
- 3) NaHCO<sub>3</sub>
- 4) Fe(OH)<sub>3</sub>
- 5) KCN

58. Poluacetalni oblici monosaharida koji se razlikuju samo po konfiguraciji na ugljenikovom atomu koji nosi poluacetalnu hidroksilnu grupu nazivaju se:

- 1) anomerni še eri
- 2) epimerni še eri
- 3) diastereoizomerni še eri
- 4) amino-še eri
- 5) invertni še eri

59. Felingov rastvor redukuje:

- 1) aceton
- 2) acetofenon
- 3) laktosa
- 4) saharoza
- 5) dietil-keton

60. Oleinska kiselina je:

- 1) 3-pentenska kiselina
- 2) arahidonska kiselina
- 3) cis-10-oktadecenska kiselina
- 4) cis-9-oktadecenska kiselina
- 5) sir etna kiselina

## ODGOVORI NA PITANJA

1			<b>3</b>		
2				<b>4</b>	
3		<b>2</b>			
4	<b>1</b>				
5					<b>5</b>
6	<b>1</b>				
7		<b>2</b>			
8					<b>5</b>
9		<b>2</b>			
1			<b>3</b>		
11	<b>1</b>				
12	<b>1</b>				
13		<b>3</b>			
14		<b>3</b>			
15	<b>2</b>				

16					<b>5</b>
17			<b>2</b>		
18					<b>5</b>
19		<b>2</b>			
20				<b>4</b>	
21		<b>1</b>			
22			<b>2</b>		
23					<b>5</b>
24					<b>5</b>
25					<b>5</b>
26			<b>3</b>		
27					<b>5</b>
28			<b>3</b>		
29				<b>4</b>	
30			<b>3</b>		

31			<b>3</b>		
32					<b>5</b>
33		<b>2</b>			
34	<b>1</b>				
35	<b>1</b>				
36			<b>4</b>		
37			<b>4</b>		
38			<b>4</b>		
39			<b>4</b>		
40			<b>4</b>		
41	<b>1</b>				
42			<b>3</b>		
43			<b>3</b>		
44			<b>3</b>		
45		<b>2</b>			

46			<b>3</b>		
47					<b>5</b>
48		<b>1</b>			
49		<b>1</b>			
50		<b>1</b>			
51			<b>3</b>		
52					<b>5</b>
53				<b>4</b>	
54			<b>2</b>		
55					<b>5</b>
56		<b>1</b>			
57				<b>4</b>	
58		<b>1</b>			
59			<b>3</b>		
60				<b>4</b>	